

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FEEDER 8-11-15 + (2 MgO) + ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Toplam Azot (N)	: % 8
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 4
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: % 4
Nötr Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 11
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 11
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 15
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	: % 2
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0.02
Toplam Çinko (Zn)	: % 0.5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

FEEDER bağ, bahçe, sera ve açık alan sebze üretiminde uygun aletler ile topraktan uygulamalar için kullanılabilir. Uygulama miktarı toprak yapısına, iklim koşullarına, bitki çeşidine ve bitkinin fenolojik dönemine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması veya bir uzmana danışılması tavsiye edilir. Daha geniş bilgi için bayiinize veya firma yetkilisine başvurunuz.

KULLANIM ALANI	KULLANIM DÖNEMİ	KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
Hububat (Buğday Arpa Fiğ v.b)	Ekimden önce son toprak işlemesi veya ekimle birlikte	50 kg/da
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz Erik Şeftali Kayısı)	Uyanmadan 4-5 hafta önce ve hasat sonrası iki tekrerde kullanılmalı	25-30 kg/da
Zeytin	Erken ilkbaharda; şubat mart	35-40 kg/da
İncir	Uyanmadan önce	40-50 kg/da
Bağ	Ocak-Şubat uyanmadan 4-6 hafta önce	40-50 kg/da
Elma-Armut	Uyanmadan 2-4 hafta önce	40-50 kg/da
Açık ve Örtü Altı Sebzeler	Dikim veya ekim öncesi son toprak işleminde 15-20 cm derinliğe	50 kg/da
Tüm Endüstri Bitkilerinde (Pamuk Tütün Ayçiçeği Patates v.b.)	Son toprak işleminde	40-50 kg/da
Muz	Doğumdan 4-6 hafta önce	40-50 kg/da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
ADA TURZ. İNŞ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Karaköy Mah. 217. Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU V D 396 047 1749

Faruk DENİZ
Şirket Vekili

*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
*Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 1035
TESCİL NO : 31502
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-2.5-3-5-10-15-20-25-40-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA:

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA
TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SAN ve TİC LTD ŞTİ
Atatürk Mahallesi 217. Sokak No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
GIDA TURZ. İNŞ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. 217. Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU Y D 395 047 1749

Faruk DENİZ
Şirket Vekili