

EC FERTILIZER

BAKIRLI GÜBRE SÜSPANSİYONU

(BAKIR OKSİKLORÜR İÇERİKLİ)

BLUE COP

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Toplam Bakır (Cu) : % 17

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI: Uygulama miktarı toprak yapısına, iklim koşullarına, bitki çeşidine ve bitkinin fenolojik dönemine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması veya bir uzmana danışılması tavsiye edilir. Daha geniş bilgi için bayiinize veya firma yetkilisine başvurunuz.

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	SULAMA SUYU ile TOPRAKTAN
Sert Çekirdekli Meyvelerde (Şeftali, Kayısı, Erik, Kiraz vb).	İlkbaharda çiçek tomurcukları uyanmaya başladığında ve Sonbaharda yaprakların % 75 döküldüğünde	100 litre suya 500-1000 cc, 750-1500 cc	1-2 litre / da
Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva v.b.)	İlkbaharda çiçek tomurcukları uyanmaya başladığında ve Sonbaharda yaprakların % 75 döküldüğünde	100 litre suya 500-1000 cc, 1000-2000 cc	1-2 litre / da
Zeytin	1-Şubat sonu-mart başı 2-İlkbahar yağmurları başlamadan 3-Sonbahar yağmurları başlamadan 4- Hasattan hemen sonra	100 litre suya 750-1500 cc, 750-1500 cc, 500-1000 cc, 500-1000 cc	1-2 litre / da
Ceviz, Badem, Fındık	İlkbaharda gözlerin uyanma döneminde Sonbaharda yaprakların %70-80 i dökülünce	100 litre suya 750-1500 cc, 500-1000 cc	1-2 litre / da
Antep Fıstığı	Meyveler mercimek büyüklüğüne gelince 21 gün ara ile 2-3 uygulama	100 litre suya 500-1000 cc	1-2 litre / da
Turunçgiller	Kasım –Aralık ayında ve gerekirse çiçek oluşumuna kadar 1 veya 2 uygulama yapılır.	100 litre suya 500-1000 cc	1-2 litre / da
Bağlarda	Gözler uyanmadan önce ve yaprakların %70-80 i döküldüğünde	100 litre suya 1000-2000 cc 500-1000 cc	1-2 litre / da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Faruk DENİZ
Şirket Vekili

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
GIDA TURZ. İNŞ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. 217, Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU V D 396 047 1749

- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO :1035
TESCİL NO :28652
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK : 0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-38.5 Litre
0.645-1.290-2.580-3.870-6.450-12.9-19.350-25.8-32.250-49.665 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA
TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SAN ve TİC LTD ŞTİ
Atatürk Mahallesi 217. Sokak No: 15 TURGUTLU MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
GIDA TURİZM İNŞ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. 217. Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU / D 306 047 1749

Faruk DENİZ
Şirket Vekili